

## DIACOL

### Composição:

Contém 27 mg de bromidrato de dextrometorfano por 15 ml de xarope.

Excipientes: Sacarose, ácido cítrico anidro, metilparabeno, essência de laranja líquida, etanol a 96 por cento e água purificada.

### Forma farmacêutica:

Xarope.

### Categoria fármaco-terapêutica

DIACOL é um antitússico.

### Indicações:

Diacol é utilizado no alívio temporário da tosse não produtiva causada por irritação das vias respiratórias altas ou baixas.

### Contra-indicações:

As contra-indicações são as doenças ou situações nas quais um determinado medicamento não deve ser tomado.

DIACOL está contra-indicado nos casos de alergia (hipersensibilidade) a qualquer um dos seus componentes. Também não deve ser tomado nos casos de tosse com expectoração. Se estiver a tomar medicamentos pertencentes à classe dos inibidores da monoamino-oxidase (MAO), não deve tomar DIACOL.

### Efeitos secundários:

Efeitos secundários são aqueles efeitos que não sendo os pretendidos, podem surgir após a toma de um determinado medicamento.

Os efeitos secundários do DIACOL são raros, podendo verificar-se, por vezes, perturbações ligeiras do tracto gastrointestinal, tais como enjoos, vômitos e dores de estômago, tonturas e vertigens.

### Interações:

Chama-se interacção à influência que um medicamento pode ter sobre outros medicamentos ou sobre o resultado de análises.

Nunca deve utilizar simultaneamente DIACOL e inibidores da monoamino-oxidase (MAO). Um período de tempo de 14 dias deve decorrer entre a interrupção dos inibidores da MAO e a introdução do DIACOL.

Se estiver a tomar medicamentos com acção depressora do sistema nervoso central, os seus efeitos podem aumentar com a administração de DIACOL.

A quinidina, fluoxetina, paroxetina e venlafaxina, quando administrados concomitantemente com o DIACOL, podem aumentar o risco de reacções adversas.

### Precauções especiais de utilização:

DIACOL deve ser utilizado com precaução nos doentes com asma brônquica ou alergias.

Nos doentes debilitados ou com doença hepática deve ser utilizado com precaução. Se a tosse persistir mais do que 1 semana, se reaparecer ou se for acompanhada de febre alta, erupção cutânea ou cefaleias intensas, deve consultar o médico.

DIACOL contém 121,64 g de sacarose por 200 ml de xarope. Uma dose de 15 ml contém aproximadamente 9,1 g de sacarose. Não deve ser utilizado em doentes com intolerância hereditária à frutose, síndrome de malabsorção de glucose-galactose ou deficiência de sucrase-isomaltase.

DIACOL contém 2,75 g de etanol a 96% por 200 ml de xarope. Uma dose de 15 ml contém aproximadamente 0,20 g de etanol a 96%. Pode ser prejudicial para os doentes que sofrem de alcoolismo, doença hepática, epilepsia, doença ou traumatismo cerebral, bem como para mulheres grávidas e crianças. Pode alterar ou aumentar o efeito de outros medicamentos.

#### Advertências:

Gravidez e lactação: DIACOL não é recomendado durante a gravidez ou lactação.

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas: Nas doses terapêuticas recomendadas, não existem interferências conhecidas.

#### Posologia e modo de usar:

A não ser que o seu médico lhe dê outras indicações, DIACOL deve ser utilizado da seguinte forma:

Adolescentes, idosos e adultos: 15 ml cada 6 ou 8 horas. Dose máxima diária de 60 ml.

Crianças dos 2 aos 12 anos: posologia segundo indicação médica. Entre os 6 e os 12 anos, a dose diária máxima é de 30 ml e entre os 2 e os 6 anos de idade, a dose diária máxima é de 15 ml.

Crianças com menos de 2 anos: a utilização neste grupo etário não é recomendada.

DIACOL pode ser administrado de 4 em 4 horas, reduzindo a quantidade de xarope por toma, de maneira a não ultrapassar a dose diária máxima.

Não exceder as doses preconizadas nem utilizar continuamente por períodos longos.

O xarope pode ser, ou não, diluído num pouco de água.

#### Dose excessiva ou intoxicação:

No caso de uma ingestão maciça de DIACOL deve recorrer imediatamente à Unidade de Saúde mais próxima. Pode sentir alterações digestivas ou do sistema nervoso que obrigam a vigilância e tratamento urgente.

#### Avisos:

DIACOL contém sacarose e etanol (ver precauções especiais de utilização).

DIACOL é um medicamento não sujeito a receita médica. Comunique ao Médico ou ao Farmacêutico os efeitos secundários detectados e que não constem deste folheto.

Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças.

Após a primeira abertura do frasco, não deve utilizar o xarope após 4 anos. Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo e embalagem exterior após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

#### Apresentação:

Versão N.1.0 (2018.11.09)

Extensão prazo de validade (60 meses)  
e atribuição 48 meses validade pós-abertura

DIACOL é apresentado em frascos com 200 ml de xarope. A embalagem contém um copo -medida.

Medicamento não sujeito a receita médica.

Data da revisão deste folheto:

BIAL - Portela & C<sup>a</sup>, S.A.  
À Av. da Siderurgia Nacional  
4745-457 S. Mamede do Coronado  
Portugal